



## خون مخفی در مدفع OB

- داده شود. بهتر است این آزمایش در 3 نوبت انجام شود. پزشک معالج شما، دستور انجام آزمایشهاي را براي شما داده است که نياز است محدوديت هاي غذائي و دارويي خاصي را قبل و در خلال آزمایش مربوطه رعایت نمایيد.
- 48 تا 72 ساعت پیش از آزمایش و در طی دوره جمع آوري نمونه مدفع از خوردن گوشت قرمز، گوشت سفید، ماهي، سبزيجات خام بخصوص شلغم و ترب و تربچه ، قارچ ، کلم بروکلى ، گل کلم ، پرتقال ، موز، انگور، طالبي ، گرمك، خربزه، ترب كوهى خودداری نمایيد.
- منع مصرف داروهای زیر تا 72 ساعت قبل از آزمایش خون مخفی در مدفع :  
ايندومتاسين، کلشى سين، آسپرين، ايوبروفن، ديكلافناک سديم و داروهای استروئيدی ، وิตامين C ، انتى اسيدها ، تركيبات اهن دار، تركيبات يددار، ديووريک هاي تيازيدي و رزپين 72 ساعت قبل و در طول دوره جمع آوري نمونه قطع شود . - نکته مهم : در مورد قطع نمودن داروهای تجویز شده قبل با پزشک معالج مشورت نمایيد.
- خانم ها که عادت ماهيانه هستند تا سه روز پس از پایان دوره فوق از انجام این آزمایش خودداری نمایند .
- چنانچه بيمار به بواسير يا شقاق مجدد مبتلا بوده و خونریزی واضحی از اين ضایعات مشاهده می گردد ، قبل از انجام آزمایش به پزشک معالج اطلاع داده شود .
- نمونه باید سریعاً به آزمایشگاه تحويل داده شود.
- نمونه مدفع نباید با ادرار يا ساير مواد آلوده شود.